

Todavía tengo dignidad.
Todavía tengo pasión.
Todavía tengo determinación.

Todavía
lo tengo.

Me llamo Denise, y estas
son las historias de los
embajadores de SPARK.

Las personas que aparecen aquí son patrocinadas por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y los resultados que usted tenga pueden variar.

INDICACIÓN

RYTARY es un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Parkinson ocasionada por infección o inflamación del cerebro, o síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

RYTARY no debe tomarse con una clase de medicamentos antidepresivos conocidos con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

RYTARY podría causar adormecimiento repentino al realizar sus actividades habituales, incluso sin previo aviso y hasta un año después de haber comenzado a tomar RYTARY. Tomar RYTARY junto con otros sedantes y alcohol podría ocasionar efectos sedativos adicionales. Comuníquese a su profesional médico si tiene cualquier clase de trastorno del sueño o siente somnolencia o adormecimiento.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
46.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

SPARK (Historias de párkinson)



Historias reales con RYTARY

En la vida, el cambio es inevitable, ya sea que uno tenga que ajustarse a un nuevo hogar, a una nueva rutina o incluso a una nueva medicación. Y aun si usted elige el cambio, no significa que sea fácil. Pero saber que otros han estado antes en esa situación puede ayudarle a sentirse más informado y mejor preparado.

En este folleto, conocerá a tres embajadores de SPARK (Historias de parkinson). Son personas con enfermedad de Parkinson que quieren compartir sus experiencias con RYTARY. Esperamos que se conmueva con sus historias igual que nosotros.

Que las historias de
nuestros embajadores
de **SPARK**
despierten la suya.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Algunos efectos secundarios de RYTARY, incluidos la somnolencia y los mareos, pueden afectar su capacidad para conducir u operar una máquina. No conduzca un automóvil, ni opere una máquina, ni realice ninguna actividad para la que deba estar alerta, hasta que conozca los efectos que RYTARY produce en usted.

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocarle efectos secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como fiebre, confusión o rigidez muscular severa.

Asegúrese de informarle a su profesional médico si tiene alguna enfermedad coronaria, en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o siente latidos del corazón irregulares. Algunas personas con antecedentes o factores de riesgo de enfermedad coronaria han sufrido problemas cardíacos durante el tratamiento con RYTARY.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg



“ Mi médico me dijo que tuviera paciencia. Estoy contenta de haberlo hecho, porque RYTARY me funciona muy bien. ”

Los resultados individuales pueden variar.

Denise,
USUARIA
DE RYTARY
desde 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Algunos pacientes que toman RYTARY pueden experimentar alucinaciones (visiones, sonidos o sensaciones irreales) o pensamientos y conductas anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en cosas que no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo y pensamiento desorganizado). Si tiene alucinaciones o pensamientos o conductas anormales, hable con su profesional médico.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY®
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

La historia de Denise

Retomar RYTARY para tener periodos "OFF" más cortos.

Cuéntenos sobre usted.

Siempre fui el tipo de persona a quien le gusta reparar cosas, hablando en sentido figurado. Tomar una situación imperfecta, o a alguien con problemas, y buscar opciones para mejorarla. Me siento bien por poder devolver a otros lo que recibí.

¿Cómo comenzó su camino con la enfermedad de Parkinson?

Ese día está grabado en mi memoria. Estábamos afuera, caminando, mirando los árboles. Louie me miró y me dijo: "¿Por qué arrastras la pierna y el pie?" Me miré y me di cuenta de que tenía razón. Ese fue para mí el momento en el que lo supe.

¿Por qué quiso probar RYTARY?

Estaba tomando carbidopa/levodopa de liberación inmediata. Funcionó bien por un tiempo, pero no podía confiar en cómo iba a funcionar ese día o con esa dosis. Mi médico pensó que carbidopa/levodopa de liberación prolongada funcionaría mejor conmigo.

¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?

Para serle honesta, mi primera experiencia con RYTARY no fue muy buena. Tenía efectos secundarios, como náuseas y dolores de cabeza. Pero luego de algunas charlas con mi médico, decidimos intentarlo con RYTARY nuevamente. Esta vez seguí el tratamiento y fui feliz con los resultados.

¿Qué consejo les daría a los demás?

Usted no es su enfermedad. Uno es una persona única que casualmente tiene la enfermedad de Parkinson, y nadie lo conoce tanto como uno a sí mismo. Así que no hay que quedarse callado.

“Denise es una gran persona. Es amorosa, amable y atenta. Por si fuera poco, cocina muy bien. La frase que dice que la forma más rápida de llegar al corazón de una persona es a través de su estómago será antigua, ¡pero sigue siendo cierta!”



Louie
ESPOSO
DE DENISE

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Algunos pacientes que toman ciertos medicamentos para tratar la enfermedad de Parkinson sienten ansias internas de apostar, un mayor deseo sexual y otros impulsos intensos, e incapacidad para controlarlos. Si usted o los miembros de su familia advierten que usted está teniendo impulsos o conductas inusuales, hable con su profesional médico.

Informe a su profesional médico si comienza a realizar movimientos involuntarios anormales o si estos se agravan durante el tratamiento con RYTARY.

Informe a su profesional médico si tuvo úlcera péptica alguna vez, pues RYTARY podría aumentar las probabilidades de sangrado estomacal.

Informe a su profesional médico si tiene glaucoma, dado que RYTARY podría aumentar su presión ocular.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg



“ Como con RYTARY
tengo periodos "OFF"
más cortos, puedo
hacer mucho más de
lo que jamás me habría
imaginado con mi
diagnóstico de párkinson ”

Los resultados individuales pueden variar.

Daran,
USUARIO
DE RYTARY
desde 2015

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un riesgo más elevado de desarrollar melanoma, una forma de cáncer de piel. Consulte a su profesional médico para someterse a exámenes de piel periódicos durante el tratamiento con RYTARY.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY®
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

La historia de Daran

Un comienzo exitoso con RYTARY

Cuéntenos sobre usted.

Fui dentista por 25 años. Me encantaba hacer sonreír a la gente. Reparar sus sonrisas en sentido literal, pero también hacerlas reír.

¿Cómo comenzó su camino con la enfermedad de Parkinson?

En 2011, empezaron mis problemas. Trabajando con un paciente, me comenzó a temblar la mano izquierda. Pensé que era un episodio aislado y que al día siguiente estaría bien. Pero no.

¿Por qué quiso probar RYTARY?

Un día en 2015, hice un control de rutina y me quejé de que tenía periodos "OFF" frecuentes. Mi médico dijo: "Hay una nueva medicación que se aprobó hace poco tiempo. Deberías probarla. Se llama RYTARY".


¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?

Encontrar la dosis justa puede tomar tiempo, pero yo tuve suerte. Mi dosis inicial funcionó bien. Como con RYTARY tengo periodos "OFF" más cortos, puedo hacer mucho más de lo que jamás me habría imaginado con mi diagnóstico de párkinson

¿Qué consejo les daría a los demás?

Cada uno puede elegir cómo enfrentar esta enfermedad. Cindy y yo elegimos reírnos del párkinson. Ese método nos funcionó bien. Esperamos que los demás encuentren algo que les funcione.

“ Desde que conozco a Daran, casi siempre lo he visto sonriendo y eligiendo encontrar el humor en casi todo. ¡Tiene la maravillosa capacidad de hacer reír a la gente a pesar de todo! ”



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden ocurrir con RYTARY son náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, sueños anormales, sequedad bucal, movimientos anormales involuntarios, ansiedad, constipación, vómitos y baja presión arterial al levantarse. Después de un periodo prolongado de estar sentado o recostado, levántese lentamente.

Después del uso en el mercado, algunos pacientes que toman RYTARY han experimentado pensamientos suicidas o han intentado suicidarse. No se ha establecido una relación causal. Informe a su profesional médico si tiene pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse.

Informe a su profesional médico si queda embarazada o si tiene pensado quedar embarazada durante la terapia, o si tiene pensado amamantar o está amamantando a un bebé.

Se han denunciado efectos adversos por sobredosis involuntaria de esta medicación. Si accidentalmente toma una dosis más alta que la dosis indicada, comuníquese con su profesional médico inmediatamente.

Asegúrese de informar a su profesional médico todos los medicamentos recetados

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY®
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg



“ No me sorprendí cuando tuve problemas de náuseas al comienzo y tuve que ajustar un poco la dosis. RYTARY definitivamente me da periodos "ON" más largos, por lo que fue una gran decisión para mí.

”

Los resultados individuales pueden variar.

David,
USUARIO
DE RYTARY
desde 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

y de venta libre que usted toma, incluidos suplementos, y en especial aquellos para tratar enfermedad de Parkinson, cardiopatía, presión arterial, pensamientos anormales, tuberculosis y trastornos del sueño, y los suplementos que contengan hierro. No tome otras presentaciones de carbidopa-levodopa junto con RYTARY sin consultar a su profesional médico.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY[®]
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

La historia de David

Continuar el tratamiento con RYTARY por periodos "OFF" más cortos.

Cuéntenos sobre usted.

Soy un ex abogado litigante que se pasó 25 años luchando en favor de la justicia. Ahora, lucho contra el párkinson con boxeo.

¿Cómo comenzó su camino con la enfermedad de Parkinson?

Fue mi esposa, Roberta, quien observó que yo no estaba caminando normalmente. También me di cuenta de que tenía problemas con mi voz en el trabajo. Cuando me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, yo estaba convencido de que quería luchar contra ella.

¿Por qué quiso probar RYTARY?

He tomado varias medicaciones diferentes y tenía de 7 a 8 horas de periodo "OFF" por día. Decidí probar RYTARY cuando mi médico me dijo que me daría una hora extra de periodo "ON" en comparación con mi tratamiento anterior.

¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?

Mi médico dijo que llevaría un tiempo afinar mi dosis de RYTARY y que podría tener efectos secundarios. Por eso, al principio no me sorprendí cuando tuve problemas de náuseas.

¿Qué consejo les daría a los demás?

Yo creo que todos tenemos dos opciones cuando hablamos de párkinson. Podemos resignarnos y rendirnos, o podemos luchar. Yo fui un luchador toda mi vida, y espero que los demás también elijan luchar.

“Ojalá pudiera encontrar una cura para el párkinson, pero no puedo. Lo que puedo hacer es apoyar a David y serle lo más útil y amorosa posible.”



Roberta
ESPOSA
DE DAVID

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Asegúrese de seguir las instrucciones al tomar la medicación. Usted puede tomar RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades de la cápsula sobre una pequeña cantidad de puré de manzana (1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No conserve la mezcla del medicamento con el alimento para utilizarla más tarde.

Nota: El objetivo de la información para pacientes en tratamiento con RYTARY que se incluye anteriormente tiene como finalidad ayudarlos a usar este medicamento de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación sobre los posibles efectos adversos o no deseados. Comuníquese a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar la medicación para reducir estos efectos.

Para denunciar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472 o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas adyacentes y la Información de prescripción médica completa que se adjunta.

RYTARY
(carbidopa and levodopa)

EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg

¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS?

VISITE RYTARY.COM O HABLE CON SU PROFESIONAL
MÉDICO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



RYTARY® es una marca registrada de Impax Laboratories, LLC.

© 2019 Amneal Pharmaceuticals LLC.

Distribuida por Amneal Specialty, una división de Amneal Pharmaceuticals LLC.

Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. PP-PAT-RYT-US-0178 09/2019

RYTARY®
(carbidopa and levodopa)
EXTENDED-RELEASE CAPSULES
23.75 mg/95 mg • 36.25 mg/145 mg
48.75 mg/195 mg • 61.25 mg/245 mg